

Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19 en houdt daarvoor primair de onderstaande uitgangspunten aan. De NVL hanteert deze ook voor haar leden.

zeker over borstvoeding

Het RIVM geeft op dit moment niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin **zonder** verdenking op corona, tenzij je als professional zelf kwetsbaar bent.

Richtlijnen Infectiepreventie

De Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk kan ook voor het lactatiekundige werk worden gebruikt. Klik [hier](#) voor de richtlijn. Lactatiekundigen in de ziekenhuizen maken gebruik van [deze](#) richtlijn.



Algemene criteria

Pas naast al het andere zorgvuldig de volgende algemene criteria toe:

- Werk op afspraak; zowel consulten aan huis als op de praktijk zijn toegestaan.
- Kies, indien mogelijk, voor een telefonisch dan wel een videobel-consult.
- Triageer vlak voor de afspraak op corona-klachten en stel bij klachten het consult uit of bied het aan via beeldbellen. Gebruik voor triage de online vragenlijst op www.thuisarts.nl.
- Gebruik handschoenen bij mondonderzoek en gebruik deze op de juiste manier.
- Bewaar zoveel mogelijk afstand. Indien het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren, probeer dan het consult zo kort mogelijk te houden.

Consult op de praktijk

- Plan afspraken ruim, zodat mensen elkaar niet onnodig tegenkomen.
- Zorg dat je praktijk leeg is (geen boeken, speelgoed of andere producten).
- Geef geen hand bij binnenkomst.
- Gebruik het juiste mondkapje op de juiste manier (minimaal IIR EN 14683) en verzoek ook de cliënt een mondkapje te dragen en de hygiënemaatregelen te respecteren.
- Was je handen voor en na het consult of gebruik handalcohol.
- Laat de cliënt handen wassen bij binnenkomst of gebruik handalcohol.
- Doe handschoenen aan bij lichamelijk contact en/of wanneer je in aanraking komt met lichaamsvocht.
- Bied geen eten of drinken aan.
- Reinig en desinfecteer alle gebruikte materialen en oppervlakken na het consult (bijvoorbeeld met alcohol 70%).
- Zorg voor goede ventilatie.

Consult aan huis

- Geef geen hand bij binnenkomst.
- Overweeg het gebruik van een mondkapje bij minder dan 1,5 meter afstand; gebruik het juiste mondkapje op de juiste manier (minimaal IIR EN 14683).
- Was zowel bij binnenkomst als bij vertrek je handen of gebruik handalcohol.
- Doe handschoenen aan bij lichamelijk contact en/of wanneer je in aanraking komt met lichaamsvocht.
- Neem geen eten of drinken aan.

Consult in een instelling

- Volg naast de instructies van je instelling (ziekenhuis of JGZ) ook de bovenstaande algemene criteria.
- Overleg zorgvuldig met je werkgever over hoe te handelen bij specifieke situaties.

Bekijk [hier](#) de instructies voor het gebruik van handschoenen en mondkapjes!

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op grond van het uitgangspunt 'werk zoveel mogelijk thuis', is het advies om voorlichtingsbijeenkomsten voorlopig online te geven.